



GHI DANH HỌC SINH.....2011-2012

NHỮNG TRƯỜNG MẪU GIÁO Lớp Sơ Cấp Mẫu Giáo Đến Lớp 6

Những Học Sinh Mới đến AISD ghi danh:

Thứ Tư, 10 Tháng Tám, 2011 và Thứ Năm, 11 Tháng Tám, 2011
8:30 Sáng – 11:30 Sáng & 1:00 Trưa – 3:00 Chiều
Thứ Năm, 11 Tháng Tám, 2009: 6:00 Chiều – 8:00 Tối

Xin Đem Theo Những Giấy Cần Thiết Để Ghi Danh Cho Học Sinh Mới:

- Hồ Sơ Chích Ngừa Hiện Tại
- Chứng Minh Nơi Cư Ngụ
- Học Bạ Cuối Cùng
- Thẻ An Sinh Xã Hội
- Giấy Khai Sinh
- Chứng Minh Tên và Ngày Sinh Người Giám Hộ (như Bằng Lái Xe)

2011-2011 THÔNG TIN NGỪA CHỦNG TỪ SƠ CẤP MẪU GIÁO ĐẾN LỚP 6

Bạch Hầu/Phong Đòn Gánh/Ho Gà	Sơ Cấp Mẫu Giáo: 4 liều cho bất cứ những loại kết hợp bên trái Mẫu Giáo: Chích 5 liều của Bạch Hầu/Phong Đòn Gánh/Ho Gà; một liều phải được chích vào ngày sinh nhật hay sau 4 tuổi . Tuy nhiên, 4 liều thì đủ tiêu chuẩn nếu liều thứ bốn được chích trong hoặc sau ngày sinh nhật bốn tuổi. Sau 7 Tuổi: 3 liều đủ tiêu chuẩn nếu một liều được chích trong ngày sinh nhật hoặc sau 4 tuổi.
Bại Liệt	Sơ Cấp Mẫu Giáo: 3 liều Từ Mẫu Giáo Đến Lớp 6: 4 liều, một liều phải được chích vào ngày sinh nhật 4 tuổi hay sau đó . Tuy nhiên, 3 liều sẽ đủ tiêu chuẩn nếu liều thứ ba nhận được vào ngày sinh nhật hay sau 4 tuổi. Bất cứ những loại kết hợp của 4 liều của OPV và IPV được chích trước sinh nhật 4 tuổi, sẽ không cần chích thêm.
Bệnh Sởi, Quai Bị, và Ban Đào (MMR)	Liều thuốc MMR đầu tiên phải được chích vào ngày sinh nhật hoặc sau một tuổi. Sơ Cấp Mẫu Giáo: Cần phải có 1 liều MMR Mẫu Giáo đến Lớp 2: Cần phải có 2 liều MMR Lớp 3 - Lớp 6: 2 liều thuốc chống bệnh sởi và một liều cho quai bị và ban đào.
Viêm Gan B	Sơ Cấp Mẫu Giáo - Lớp 6: 3 liều
Thủy Đậu (Trái Rạ)	Sơ Cấp Mẫu Giáo, Lớp 3 - 6 : một liều trong ngày sinh nhật đầu tiên hoặc sau đó Hoặc- Thờ Cha Mẹ tuyên bố đau yếu. Mẫu Giáo - Lớp 2 : 2 liều trong ngày sinh nhật đầu tiên hoặc sau đó Hoặc- Thờ Cha Mẹ tuyên bố đau yếu
Viêm Gan A	Sơ Cấp Mẫu Giáo, Mẫu Giáo & Lớp 2: 2 liều trong ngày sinh nhật đầu tiên hoặc sau đó
Phế Cầu(Viêm Phổi) (PCV7)	Sơ Cấp Mẫu Giáo: Loạt liều chánh và những liều phụ thuộc sau sinh nhật một tuổi Hoặc 1 liều sau sinh nhật 2 tuổi. (Không cần sau 5 tuổi)
HIB	Sơ Cấp Mẫu Giáo: Hai liều (cách nhau 2 tháng và một liều phụ thuộc trong hoặc sau 12 tháng tuổi, chích ít nhất 2 tháng sau liều cuối hoặc ít nhất một liều chích sau 15 tháng (Không cần chích sau 5 tuổi)